

宇宙科学II（電波天文学） 第1回

国立天文台
本間 希樹

今日の内容

今日は初回なのでお話が中心

- 自己紹介
- 自分の研究紹介
VERA、サブミリ波VLBI

（電波天文学の入門をかねて）

自己紹介など

氏名： 本間 希樹(ほんま まれき)

所属： 国立天文台水沢VLBI観測所

連絡先： 〒181-8588

三鷹市大沢2-21-1

メール： mareki.honma@nao.ac.jp

電話：0422-34-3640

HP: <http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/VERA/honma/index.htm>
(googleに“本間 希樹”で検索)

※20年前(1990年)に東大駒場に入学

研究テーマ

現在の主要な研究テーマ

- 超長基線電波干渉計(VLBI)の手法を用いた銀河系構造の研究
- サブミリ波VLBIを用いたブラックホールの直接撮像

VLBI : Very Long Baseline Interferometer

国立天文台について

- もともとは東京大学東京天文台(1888年～)
- 1988年に国立天文台に改組
- 大学共同利用機関として、大型の望遠鏡を建設、運営




野辺山宇宙電波
観測所(長野県)



すばる望遠鏡
(ハワイ)



VERA



ALMA
(チリ アタカマ高地)

他にも多数の望遠鏡有り

主な仕事場

- 国立天文台三鷹
オフィスがある(滞在半分くらい)
- 国立天文台水沢 (岩手県奥州市)
VERAの運用センターがある(年間2ヶ月程度滞在)
- チリ アタカマ高地
国立天文台のASTE望遠鏡がある。サブミリ波VLBI
という新しいプロジェクトを推進中(年間1ヶ月?)

研究室見学など歓迎です

この授業の進め方


- パワーポイントをベース？
- 重要な事項はできれば板書したいが...
(参加人数、参加者層などによる...)
- 評価はレポートで(何回か課題を出す)

私の研究紹介

主な研究対象: 銀河系

- VERA
銀河系の真の姿を描き出す
- サブミリ波VLBI
銀河系中心のブラックホールを直接撮像する


銀河系 = 天の川



天の川が星の集まりであることを発見したのはガリレオ

2009年は世界天文年でした

- 2009年:ガリレオが初めて望遠鏡で宇宙を観測(1609年)してから400年目



ガリレオ・ガリレイ
1564-1642




ガリレオの望遠鏡

銀河系の想像図

- 特徴
円盤状、渦巻きがある
星の数:約2000億
中心にはブラックホール?



M63銀河
(銀河系もこんな形?)



光の速さ と 光年

光の速さ : 毎秒 30万 キロメートル
地球1週 0. 13秒
月まで 1. 3秒 (月まで38万km)


光年 : 光が一年に進む距離
キロメートルで表すと:
毎秒 30万 km x 365 x 24 x 3600 =
9460800000000 km

VERA

— 銀河系の3次元測量 —

VERAについて

- VERA: VLBI Exploration of Radio Astrometry
- 4台の望遠鏡からなる電波干渉計
- 銀河系内の天体の距離を精密に測り最新の銀河系像を描く



銀河系全域の測量は未知の世界




銀河系全域の測量は、まだ手付かずの未開の領域！
これまでの100倍の精度を持つ新しい望遠鏡が必要！

星の距離を測る

- 年周視差法
三角測量の原理で、仮定なしに天体の距離を測る方法。

地球の公転を利用し、
星の位置の年周変動を
測定

基準： 地球—太陽間の距離
1天文単位=1億5000万 km



年周視差の模式図

年周視差は小さい

太陽に最も近い星： ケンタウルス座 α 星

距離 4.3 光年
(=27万天文単位)

視差 0.7 秒角
(1/5000 度)

- 距離が遠い
- 視差が小さい
- 観測が難しい



八重山諸島からみた南天の星

角度の単位について

- 角度の単位

1回転 = 360度


1分角 = 60分の1度

1秒角 = 60分の1分角

= 3600分の1度

(1ミリ秒角=1000分の1秒角)

(1 μ 秒角=100万分の1秒角)



ランドルト環

- 人間の視力

視力 1.0 : 1分角を見分けることができる

(3m先にある大きさ1mmのものに相当。)

距離の単位について

- 年周視差1秒角に相当する距離を

1 pc (パーセク) と呼ぶ

- 1000 pc = 1 kpc (キロパーセク)

- 1000 kpc = 1 Mpc (メガパーセク)

- 1 pc \sim 3.09 x 10¹³ km \sim 3.26 光年

- 太陽近傍の星まで \sim 数 pc

- 銀河系の中心まで \sim 8 kpc

- 隣の銀河まで \sim 1 Mpc


銀河系測量の要求精度

- 銀河系中心 8 kpc
→ 年周視差 125 μ 秒角
これを見分けるには 10 μ 秒角 (約4億分の1度)
レベルの測定精度が必要
(月面上の1円玉を地球から見たときの角度)



銀河系の測量からわかること

- 銀河系の大きさ、構造
- 天体の距離、明るさ、大きさ 等々
(銀河系内の天体を対象としたすべての天文学研究の基礎)



渦巻銀河(左)と棒渦巻銀河(右)

天の川はどっちだろう?

- 暗黒物質(光らない物質)の量と分布

VERA: VLBI Expolration of Radio Astrometry

4台の電波干渉計で
銀河系の測量を行う

入来




水沢



石垣島



小笠原




最長基線 : 2300 km
完成 : 2002年春
観測 : 2004年～

南の楽園 石垣島



銀河系測量をめぐる状況


- 国際衛星プロジェクトが複数予定されている



GAIA (ヨーロッパ)
2013年打ち上げ



SIM (アメリカ)
2015年打ち上げ



JASMINE (日本)
2018年打ち上げ?

目標はいずれも、銀河系の測量

VERAの利点: 早くから観測開始、電波
VERAの難点: 天体数が少ない.

高精度位置天文ミッション

10 マイクロ秒角以下を目指した計画が複数存在

name	type	band	start year	accuracy	# of stars
SIM	space	opt	~2013	10 μ as or higher	10 ⁴
GAIA	space	opt	~2015	10 μ as	10 ⁹
JASMINE	space	IR	2018 ?	10 μ as	10 ⁸
VERA	VLBI	radio	2004	10 μ as	10 ³


VERAの最新の結果については別の回に

サブミリ波VLBI


— 銀河系中心の巨大ブラックホールを見る —

Sgr A* : 銀河系中心の巨大ブラックホール

- Sgr A* (射手座Aスター)
- 銀河系中心にある巨大ブラックホール
- 太陽の4百万倍の質量



赤外線で見えたSgr A*周囲の星の運動



ブラックホールは見える？

- ブラックホール自身は暗い(はず)
(ブラックホールとは、強い重力により光さえ吸収)
- しかし、ブラックホールに落ち込むガスが回転しながら高温で明るく輝くので、それを背景に「黒い穴」が見えると期待される。でも、まだ誰も見ていない...



Fukue et al. (1988)

銀河系中心のブラックホールは「黒い穴」の見た目サイズが最も大きい



直径~30マイクロ秒角
(波長の短い電波干渉計なら分解可能)

ブラックホールを見る

望遠鏡の分解能 θ は口径Dと波長 λ で次のように書ける。

$$\theta \sim \lambda / D$$

波長 λ が短いほど有利。 $\lambda \sim 1\text{mm}$, $D \sim 8000\text{ km}$ なら $\theta \sim 25\ \mu$ 秒角




Doeleman et al. 2008 in Nature

2008年にMITを中心とするグループが1.3mmでSgr A*の構造を~40 μ 秒まで分解。シャドウ分解まであと一歩？

ASTEを用いたサブミリ波VLBI

- 国立天文台のASTE望遠鏡
サブミリ波観測に適したチリ・アタカマ砂漠(標高4860m)にある。これを米国の望遠鏡と組み合わせて銀河系中心ブラックホールの国際観測を推進中。



4月に初の観測

- 2010年4月3日、4日に、ASTEを用いた初のサブミリ波VLBI観測を実行(先週までにチリにいました...)

観測までの道のり



2010年1月の作業: 観測用コンテナを設置し、ケーブルを敷設

ASTE VLBI観測まで

- VLBI観測用の装置を入れるコンテナを設置
- 受信機をアンテナに搭載



数ヶ月の立上げの苦勞の後、4月初旬に2晩の観測を実行。現在結果待ち。

今後数年～10年でブラックホールの黒い穴が見えるかといふ？


アタカマ高地の話

- アタカマ高地(アタカマ砂漠)
チリのアンデス山脈中に広がる
標高5000mの砂漠地帯
- 空気が乾燥して水蒸気量が
少ないために、天文観測に
適している
- 最近、多数の望遠鏡が
建設されている



ALMA

- Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (スペイン語で「魂」という意味)
- 日米欧の国際協力で66台以上のミリ波サブミリ波干渉計を建設(現在建設中)



ALMAの想像図 (チリアタカマ砂漠 標高5200m)

ALMAへの道



ALMAへの道



ALMAへの道



ALMAへの道



ALMAの現状



ベースキャンプ（標高2900m、ここでアンテナを組み立て調整）

ALMAの現状




ALMA Roadでアンテナを運ぶTransporter (この日は空っぽ)とすれ違い

ALMAの現状




サイト (標高5200m、現在3台のアンテナが設置され試験中)

アタカマの望遠鏡たち



ASTE (国立天文台、電波、直径10m)



TAO (東大、赤外、口径1m)



APEX (欧州、電波、直径12m)



QUIET (国際共同、電波)